



יולי- ספטמבר 2017

עלון מכון גרטנר

כתבות חדשות

שיעורי לידות חי בנשים שעברו הפריה חוץ גופית דומה למדווח במדינות אירופה

בכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר הפוריות שהתקיים **במאי 2017**, הוצגו נתונים מתוך המסד הלאומי לטיפול הפריה חוץ גופית, המתנהל **ביחידה לחקר בריאות האשה והילד**. דווח כי שיעור לידות החי בנשים שטופלו לפני גיל 35 הינו 31.3%; שיעור זה דומה למדווח במדינות אירופה. ככל שגיל האישה עולה כך גם יורדים שיעורי לידות החי ועומדים על 3.8% בלבד בנשים שטופלו בגיל 43 ומעלה.

[לכתבה המלאה](#)

גורמי סיכון תעסוקתיים לפיתוח סרטן בקרב עובדי מקצועות בריאות

עובדי ב"ח לרבות רופאים, אחיות, וצוות פרא רפואי חשופים למגוון גורמים כימיים, ביולוגיים ופיזיקליים. **ביחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה** יחל **באוקטובר 2017** מחקר שמטרתו להעריך את הסיכון של בעלי מקצוע שונים במחלקות שונות לחלות בסרטן. הערכת חשיפות תעסוקתיות המעלות את הסיכון לפיתוח סרטן, תתרום לחקר אטיולוגית המחלה, תאפשר אפיון קבוצות עובדים המצויות בסיכון גבוה לתחלואה, וכן הגדרת תכניות לצמצום חשיפה לחומרים מזיקים בקרב עובדי בריאות בישראל.

[לכתבה המלאה](#)

כמה מחלימים מסרטן יימצאו בישראל עד שנת 2024?

היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה מבצעת חישובים שמטרתם לחזות את מספר המחלימים מסרטן (cancer survivors) שיימצאו בישראל עד שנת 2024. מודל החיזוי מתבסס על נתונים מרישום סרטן עד שנת 2013 (השנה האחרונה שבה קיימים נתוני רישום סרטן מלאים ומהימנים). החיזוי בוצע בנפרד עבור גברים ונשים, תוך שימוש במודלים שונים, מתוכם נבחר המודל האופטימלי, בהתבסס על שימוש בנתוני עבר.

[לכתבה המלאה](#)



האם שירותי הבריאות בישראל מתאימים לצרכי אוכלוסיית שורדות סרטן השד?

בעקבות העלייה המרשימה שחלה בהישרדות חולות הסרטן התבצע **ביחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה** מחקר שבחן את מידת התאמת שירותי הבריאות בארץ לנשים שחלו בסרטן השד ונותרו בחיים כ-10 שנים לאחר האבחנה. בקרב השורדות נצפו צריכה גבוהה של שירותי בריאות וחוסר בתמיכה נפשית (שאינם מוסברים ע"י מצב בריאותן). ממצאי המחקר תומכים בצורך בפיתוח תכניות לשיפור רצף ותיאום המעקב אחר שורדות סרטן השד בישראל. ממצאים אלו סוכמו עד כה בשני מאמרים מדעיים שפורסו לאחרונה.

[לכתבה המלאה](#)

בוגרים יוצאי אתיופיה בסיכון גבוה לפתח סוכרת

במחקר שנערך **ביחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם**, בשיתוף עם ד"ר ענת יפה מבי"ח הלל יפה, נמצא כי העולים מאתיופיה בקבוצת הגיל הצעירה (בני 20-49), נמצאים בסיכון גבוה פי 2.4 לפתח סוכרת (בעיקר סוג-2) בהשוואה ליהודים ילידי הארץ מקבוצת גיל זו. לעומת זאת, הסיכון לפתח סוכרת בקרב עולים מאתיופיה בקבוצת הגיל המבוגר (בני 60 ומעלה) היה דומה לזה שבקרב יהודים ילידי-הארץ. המחקר נערך בשיתוף חוקרים **מהיחידות לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה ומידע ומחשוב**, ושותפים במחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית. תוצאות המחקר סוכמו במאמר מדעי.

[לכתבה המלאה](#)

סיכון מוגבר לסוכרת בקרב בוגרים מהאוכלוסייה הערבית בישראל

במחקר שנערך **ביחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם**, בשיתוף עם ד"ר ענת יפה מבי"ח הלל יפה, נמצא כי האוכלוסייה הערבית הבוגרת בישראל נמצאת בסיכון גבוה לפתח סוכרת (בעיקר סוג-2). הסיכון המוגבר לסוכרת בקרב האוכלוסייה הערבית, גבוה פי 1.5-2.0 לעומת האוכלוסייה היהודית שאינה ממוצא אתיופי, בולט יותר בקבוצת הגיל הצעירה (בני 20-49), ובקרב הנשים. המחקר נערך בשיתוף חוקרים **מהיחידות לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה ומידע ומחשוב**, ושותפים במחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית. תוצאות המחקר סוכמו במאמר מדעי.

[לכתבה המלאה](#)



האם אכן קיימת עלייה בשיעור העישון בשנת 2016 או שהעליה היא תוצאה של שינוי בשיטת הדגימה?

עלייה משמעותית בשימוש בטלפונים סלולריים וירידה בשימוש ובבעלות בקווים ניחים מובילה לייצוג חסר של תתי אוכלוסיות בסקרים המסורתיים המתבססים על טלפונים ניחים ולהטיה אפשרית במדדים. **בשנת 2016** שולבו לראשונה מדגמים של טלפונים סלולריים בנוסף לניחים, בסקרי בריאות שעורך המרכז הלאומי לבקרת מחלות, וכתוצאה מכך התקבל אומדן שיעור עישון גבוה בהשוואה לשנים קודמות. נשאלה השאלה האם אכן קיימת עלייה בשיעור העישון או שהיא נגרמה על ידי השינוי בשיטת הדגימה? **היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה** נשאלה, בדקה והשיבה.

[לכתבה המלאה](#)

מדיניות ישראל בנושא בטיחות בדרכים הועברה לארגון ה- WHO

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, משמש כארגון שותף לארגון הבריאות העולמי ה- WHO (Collaboration center). המרכז רכז בפעם הרביעית פרויקט לאומי בנושא בטיחות בדרכים (Global status report on road safety IV), שמטרתו להציג ל- WHO את מדיניות מדינת ישראל בתחום, ולהוות חלק מהדו"ח העולמי אשר יתפרסם במהלך 2017.

[לכתבה המלאה](#)

זיהום אויר משפיע על תינוקות כבר בהיותם ברחם

מחקר שנערך **ביחידה לחקר בריאות האשה והילד** וכלל מעל 200,000 הריונות מצא כי חשיפה מוגברת לזיהום אויר גורמת לעליה מתונה בסיכון למומים מולדים, לידות מוקדמות ולידה במשקל נמוך. כמו כן, נמצא רמז על השפעה גדולה יותר של זיהום אויר בהריונות מהפריה חוץ גופית. המחקר בוצע בשיתוף עם מכון ויצמן ואוניברסיטת ת"א ומומן ע"י הקרן לבריאות הסביבה. מאמר בנושא פורסם בכתב העת Environmental Research

[לכתבה המלאה](#)

